Pengaruh Substrat Afkir Jamur Kayu Dan Metode Pembuatan Bibit Yang Berbeda Pada Pertumbuhan Dan Produksi Jamur Merang (*Volvariella Volvaceae*) Dengan Sistem Nampan Bersusun

Agus Sugianto¹, Anis Sholihah¹ dan Siti Muslikah¹

¹ Dosen Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Islam Malang
Jl. MT. Haryono No. 193 Malang
Korespondensi : agus.sugianto@unisma.ac.id

Abstrak

Jamur merang merupakan salah satu jenis jamur yang banyak digunakan sebagai olahan makanan, permintaan jamur merang terus meningkat menyebabkan nilai ekonominya juga terus meningkat. Selama ini budidaya jamur merang membutuhkan tempat yang luas sehingga perlu dilakukan terobosan inovasi budidaya dengan sistem nampan. Kandungan mineral limbah media jamur kayu yang tersisa dapat digunakan sebagai campuran media tumbuh jamur merang. Pembuatan bibit metode tanam eksplan langsung baru sebatas bibit jamur kayu dan belum pernah digunakan pada jamur merang maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui respon pertumbuhan dan produksi jamur merang serta mengetahui analisis nilai usaha tani. Rancangan yang digunakan RAL faktorial dua faktor, faktor pertama yaitu penambahan substrat afkir jamur kayu dan faktor kedua adalah metode pembuatan bibit yang berbeda. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 4 kali. Hasil penelitian menunjukkan secara umum tidak banyak terjadi interaksi antar perlakuan, namun secara terpisah perlakuan metode pembuatan bibit yang berbeda memiliki masa pertumbuhan yang berbeda, pada metode bibit TEL (tanam eksplan langsung) memiliki periode masa panen total selama 20 hari dan metode BMM (biakan murni mieselum) 24 hari. Hasil analisis usaha tani penggunaan limbah jamur 40% memiliki nilai usaha tani paling tinggi dalam 11 periode tanam.

Kata Kunci : Jamur Merang, Limbah Baglog Afkir, Sistem Nampan Bersusun.

Abstract

Straw mushroom is one type of fungus that is widely used as processed food, the demand for mushrooms continues to increase, causing its economic value to continue to increase. During this time the cultivation of merang mushrooms requires a large place so that it needs to be a breakthrough innovation in cultivation with a tray system. The remaining mineral content of wood mushroom media can be used as a media mixture of growing mushroom. Making seedlings for direct explant planting methods is limited to wood mushroom seedlings and has never been used on straw mushrooms, further research needs to be done. The purpose of this study was to determine the response of growth and production of mushroom and to find out the analysis of farm value. The design used in factorial RAL is two factors, the first factor is the addition of wood mushroom substrate rejections and the second factor is the method of making different seeds. Each treatment was repeated 4 times. The results showed that in general there was not much interaction between treatments, but separately the treatment of different seedling methods had different growth periods, the TEL seed method had a total harvest period of 20 days and a BMM method of 24 days. The results of farming analysis using 40% mushroom waste have the highest farming value in 11 planting periods.

Kata Kunci : straw mushroom, Residual Baglog Waste, Compiled Tray System.

Pendahuluan

Jamur merang (*Volvariella volvacea* L.) merupakan salah satu jenis jamur yang banyak digunakan sebagai bahan maupun olahan makanan. Rasa, tekstur, dan kandungan gizi yang tinggi menyebabkan jamur merang semakin banyak digemari oleh seluruh lapisan masyarakat mulai dari lapisan menengah kebawah hingga menengah keatas, hal ini mendorong permintaan yang besar terhadap ketersediaan jamur merang dan menyebabkan nilai ekonominya juga terus meningkat. Atas dasar tersebut tidak sedikit masyarakat perkotaan yang ingin melakukan budidaya jamur merang akan tetapi terkendala oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknik budidaya jamur merang dan juga terkendala oleh tempat budidaya, karena selama ini budidaya jamur merang memerlukan tempat yang luas dan peralatan yang cukup banyak. Atas dasar tersebut maka diperlukanlah sebuah terobosan inovasi teknologi tepat guna dalam melakukan budidaya jamur merang bagi masyarakat perkotaan yang ingin melakukan budidaya jamur merang namun terkendala oleh permasalahan diatas..

Limbah baglog jamur kayu memiliki kandungan lignin dan selulosa yang cukup tinggi. Lignin dan selulosa

merupakan zat yang berfungsi sebagai penyusun sel yang terdapat di dalam kayu. Sugianto (2015) menerangkan kandungan mineral limbah media jamur kayu mengalami peningkatan setelah panen terutama setelah panen pertama, panen kedua dan panen ketiga terus mengalami peningkatan yaitu Protein 9.15%, Air 12,26%, Abu 32,35%, Kalsium 1,45%, Phosphor 0,39%, Lemak 0,40%, dan NaCl 0,7%. Tingginya kandungan mineral limbah baglog jamur kayu sehingga dapat digunakan sebagai campuran substrat tanam jamur merang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pembuatan bibit metode tanam eksplan langsung (TEL) memiliki kecepatan lebih baik untuk memenuhi substrat tanam dan memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap kontaminasi (Hafifi, 2013). Akan tetapi selama ini pembuatan bibit metode tanam eksplan langsung baru sebatas bibit jamur tiram dan belum pernah digunakan pada jamur merang maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Objek penelitian ini adalah substrat tanam jerami padi dicampur dengan limbah baglog jamur kayu dan dikombinasikan dengan metode pembuatan bibit yang berbeda. Namun belum diketahui sampai berapa persen tambahan limbah jamur kayu tersebut mampu menghasilkan badan buah

jamur yang optimum. Maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui komposisi yang tepat.

Bahan dan Metode

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Budidaya jamur Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Islam Malang pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2018. Lokasi ini terletak pada ketinggian 550 m dpl, suhu harian rata-rata 25-27 °C.

Alat yang digunakan adalah: sabit, karung, ember, terpal/plastik, kompor gas, LPG, Drum, Autoclave, *Laminar Air Flow* (LAF), botol saos, thermometer, hygrometer, *beaker glass*, *hand sprayer*, bunsen, kapas, karet penutup botol, pinset, sendok bibit, scalpel, karet gelang, timbangan, pH meter, mistar, plastik rol bening 0,05 mm, dan jangka sorong. Bahan yang digunakan adalah jerami padi, limbah baglog jamur kayu, alkohol 90%, spirtus, kalsium karbonat (CaCO_3), bekatul, dextrose, agar-agar, kentang, dan bibit F_2 jamur merang (*Volvariella volvacea*) yang dibuat dengan menggunakan metode TEL (Tanam Eksplan Langsung) dan BMM (Biakan Murni Miselium).

Rancangan penelitian ini Rancangan Acak Lengkap (RAL) Faktorial dua faktor, faktor pertama penambahan substrat akfir jamur kayu yang terdiri dari 5 level: L_0 = 0% limbah

baglog jamur kayu, L_1 = 10% limbah baglog jamur kayu, L_2 = 20% limbah baglog jamur kayu, L_3 = 30% limbah baglog jamur kayu, L_4 = 40% limbah baglog jamur kayu. Factor kedua metode pembuatan bibit yang berbeda yang terdiri dari 2 level: M_1 (TEL) M_2 (BMM). Dari kedua faktor tersebut diperoleh 10 kombinasi perlakuan yang diulang sebanyak 4 kali.

Variabel yang diamati setelah inokulasi hingga panen meliputi: Kemampuan miselium memenuhi media (hsi), waktu pertama muncul badan buah (*Pinhead*) (hsi), waktu pertama panen (hsi), panjang badan buah (cm), jumlah total seluruh badan buah jamur merang (buah), bobot segar total badan buah (g), periode masa panen total (hari), nilai Efisiensi Biologi pada tiap perlakuan dapat diketahui dengan cara dihitung menggunakan rumus berikut ini : $EB = \text{Bobot segar total panen (g)} : \text{Bobot Substrat Awal} \times 100\%$, dan analisis usaha tani dilakukan untuk mengetahui kelayakan budidaya jamur merang.

Data yang didapat dianalisis dengan uji tara 5% (ANOVA). Jika terdapat pengaruh yang nyata maka akan dilanjutkan dengan uji BNJ 5% untuk mengetahui perbedaan tiap-tiap perlakuan.

Hasil dan Pembahasan

Kecepatan Miselium Memenuhi Media

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat interaksi antara penambahan substrat afkir jamur kayu dan metode pembuatan bibit yang berbeda terhadap variabel pertumbuhan, kecepatan miselium memenuhi media (Tabel 1). Secara terpisah metode pembuatan bibit berpengaruh nyata terhadap kecepatan miselium memenuhi media. Rata-rata kecepatan miselium terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rata-Rata Kecepatan Miselium Memenuhi Media

Perlakuan	Rata-rata Lama Miselium Memenuhi Media (hsi)
L ₀	4,00
L ₁	3.63
L ₂	3.50
L ₃	3.25
L ₄	3.25
BNJ (5%)	TN
M ₁	2.25 a
M ₂	4.80 b
BNJ (5%)	1.03

Keterangan: - Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNJ 5%. -TN: Tidak Nyata. (hsi) : Hari Setelah Inokulasi

Tabel 1 menunjukkan perlakuan M₁ miselium lebih cepat memenuhi media dibanding M₂ pada rata-rata hari ke 2.25 (hsi) miselium telah memenuhi media. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan miselium yang cukup

bagus karena miselium memenuhi media pada hari ke- 2.

Hafifi (2013) mengungkapkan, penggunaan bibit TEL memberikan pengaruh selisih lebih antara metode yang digunakan, yaitu memberikan pengaruh lebih cepat dibandingkan dengan metode BMM. Selisih kedua metode tersebut mencapai kisaran 0.84 sampai dengan 1.96 hari hal tersebut menunjukkan miselium dari BMM lebih lambat dibandingkan dengan metode TEL. Selisih pertumbuhan miselium kedua metode tersebut mencapai 2 hari. Berbeda jika dilakukan perhitungan antara generasi bibit, maka metode TEL cenderung stabil dibandingkan metode BMM. Hal ini menunjukkan bahwa metode TEL memiliki daya adaptasi yang lebih baik (Sugianto, 2017).

Waktu Muncul Badan Buah

Hasil analisis ragam menunjukkan tidak terdapat interaksi penambahan substrat jamur kayu afkir dan metode pembuatan bibit yang berbeda namun secara terpisah perlakuan metode bibit yang digunakan memberikan pengaruh nyata terhadap waktu muncul badan buah seperti yang terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rata-rata Waktu Muncul Badan Buah (*Pindhead*) Pertama

Perlakuan	Muncul Badan Buah Pertama (hsi)
L ₀	5.75
L ₁	5.50
L ₂	5.50
L ₃	5.50
L ₄	5.25
BNJ (5%)	TN
M ₁	4.20 a
M ₂	6.80 b
BNJ (5%)	1.21

Keterangan: - Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNJ 5%. -TN: Tidak Nyata. (hsi) : Hari Setelah Inokulasi

Pada Tabel 2 menunjukkan perlakuan M₁ (TEL) waktu muncul badan buah (*pindhead*) pertama lebih cepat daripada perlakuan M₂ (BMM). Metode M₁ muncul badan buah rata-rata pada hari ke 4.20 (hsi) sedangkan M₂ rata-rata pada hari ke 6 (hsi). Hal tersebut menunjukkan semakin cepat miselium memenuhi substrat tanam maka akan semakin cepat pula pertumbuhan calon badan buah (*pinhead*). Selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Sumiati dkk. (2009) bahwa semakin cepat penyebaran miselium maka akan semakin cepat pula dalam pembentukan badan buah.

Waktu Panen Pertama

Hasil analisis ragam menunjukkan tidak terdapat interaksi penambahan substrat jamur kayu afkir dan metode pembuatan bibit yang berbeda namun secara terpisah

perlakuan metode bibit yang digunakan memberikan pengaruh nyata terhadap waktu panen pertama seperti yang terlampir pada Tabel 3.

Tabel 3. Rata-rata Hari Panen Pertama

Perlakuan	Rata-rata hari panen pertama (hsi).
L ₀	8.13
L ₁	7.38
L ₂	7.50
L ₃	7.75
L ₄	7.60
BNJ (5%)	TN
M ₁	6.35 a
M ₂	9.00 b
BNJ (5%)	1.43

Keterangan: - Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNJ 5%. -TN: Tidak Nyata. (hsi) : Hari Setelah Inokulasi

Tabel 3 menunjukkan perlakuan M₁ (TEL) waktu panen pertama (hsi) lebih cepat daripada perlakuan M₂ (BMM) pada rata-rata hari ke 6.35 (hsi).

Panjang Badan Buah

Hasil analisis ragam menunjukkan tidak terdapat interaksi penambahan substrat jamur kayu afkir dan metode pembuatan bibit berbeda namun secara terpisah perlakuan penambahan substrat jamur kayu afkir memberikan pengaruh nyata terhadap panjang badan buah. seperti yang terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Rata-rata Panjang Badan Buah

Perlakuan	Rata-rata Panjang Badan Buah (cm)
L ₀	2.83 a
L ₁	2.85 ab
L ₂	2.87 ab
L ₃	2.99 b
L ₄	2.93 b
BNJ (5%)	0.14
M ₁	2.87
M ₂	2.92
BNJ (5%)	TN

Keterangan: - Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNJ 5%. -TN: Tidak Nyata. (hsi) : Hari Setelah Inokulasi

Pada Tabel 4 menunjukkan perlakuan L₃ (30% substrat afkir) memiliki panjang badan buah paling tinggi yakni 2.99 cm namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan L₄ (40% substrat afkir) 2.93 cm, L₂ (20% substrat afkir) 2.87 cm dan L₁ (10% substrat afkir) 2.85 cm namun berbeda nyata dengan perlakuan L₀ (tanpa substrat afkir) memiliki panjang paling rendah yakni 2.83 cm.

Jumlah Total Badan Buah

Hasil analisis ragam menunjukkan tidak terdapat interaksi nyata penambahan substrat jamur kayu afkir dan metode pembuatan bibit berbeda pada jumlah total badan buah demikian juga secara terpisah tidak menunjukkan pengaruh yang nyata. Rata-rata jumlah total badan buah tersaji dalam Tabel 5.

Tabel 5. Rata-rata Panjang Badan Buah

Perlakuan	Jumlah total badan buah (buah)
L ₀	24.25
L ₁	26.50
L ₂	26,00
L ₃	25.13
L ₄	27,00
BNJ (5%)	TN
M ₁	26.80
M ₂	24.75
BNJ (5%)	TN

Keterangan: - Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNJ 5%. -TN: Tidak Nyata. (hsi) : Hari Setelah Inokulasi

Bobot Segar Total Badan Buah

Hasil analisis ragam menunjukkan tidak terdapat interaksi nyata penambahan substrat jamur kayu afkir dan metode pembuatan bibit berbeda pada bobot segar total badan buah. Rata-rata bobot segar total badan buah tersaji dalam Gambar 1.

Gambar 1. Rata-rata Total Bobot Segar Total Badan Buah (g)

Pada Gambar 6 terlihat penambahan substrat afkir tidak menunjukkan perbedaan yang nyata namun penambahan 40% (L₄) cenderung menunjukkan total bobot

segar badan buah tertinggi dibanding perlakuan yang lain. Perlakuan metode pembuatan bibit juga tidak menunjukkan perbedaan nyata.

Efisiensi Biologi dan Periode Masa Panen Total

Hasil analisis ragam menunjukkan tidak terdapat interaksi nyata penambahan substrat akhir dan metode pembuatan bibit yang berbeda pada nilai efisiensi biologi dan periode masa panen total. Secara terpisah metode pembuatan bibit berpengaruh nyata pada periode masa panen. Rata-rata efisiensi biologi dan periode masa panen total terlihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Rata-rata Efisiensi Biologi (%) dan Periode Masa Panen (hari)

Perlakuan	Efisiensi Biologi (%)	Periode Masa Panen (hari)
L ₀	15.73	23.13
L ₁	16.44	22.75
L ₂	15.74	21.75
L ₃	15.74	22.75
L ₄	15.70	21.25
BNJ (5%)	TN	TN
M ₁	16.11	20.25 a
M ₂	15.64	24.25 b
BNJ (5%)	TN	2.43

Keterangan: - Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNJ 5%. -TN: Tidak Nyata. (hsi) : Hari Setelah Inokulasi

Periode panen total metode bibit M₁ (TEL) lebih cepat selesai daripada metode bibit M₂ (BMM) dimana M₁ rata-rata hari ke- 20,25 (hsi) sedang M₂ rata-

rata selesai pada hari ke- 24,25 lebih lambat 4 hari dibandingkan dengan metode bibit M₁. Kualitas media yang baik dapat dilihat dengan menghitung nilai efisiensi biologi (EB). Nilai efisiensi biologi memberikan pengertian bahwa dalam substrat tanam jamur seberapa besar yang mampu dirubah menjadi badan buah. Nilai efisiensi biologi (EB) tinggi menunjukkan bahwa dari substrat tanam berhasil dikonversi menjadi badan buah tinggi. Substrat dari jerami gandum menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dibanding substrat dari jerami padi (Kumar *et.al*, 2016).

Shah *et.al*. (2004) yang mendapatkan efisiensi biologi tertinggi pada serbuk gergaji tanpa campuran lain yaitu sebesar 64% dibanding serbuk gergaji dengan campuran jerami gandum (1:1) dan jerami gandum tanpa campuran berturut-turut 44% dan 58%. Sejalan juga dengan penelitian Kimenju *et.al*. (2009) serbuk gergaji mempunyai efisiensi biologi sebesar 92%.

Analisis Usaha Tani dan R/C ratio

Hasil analisis ragam menunjukkan tidak terdapat interaksi nyata penambahan substrat akhir dan metode pembuatan bibit yang berbeda berbeda pada analisis usaha tani dan R/C rasio. Pendapatan usaha tani dan nilai R/C rasio terlihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Pendapatan Usaha Tani (Rp) dan nilai R/C rasio

Perlakuan	Pendapatan Usaha Tani (Rp)	R/C rasio
L ₀	Rp. 12.977.318	1.78
L ₁	Rp. 14.696.963	2.00
L ₂	Rp. 15.155.869	2.05
L ₃	Rp. 16.240.813	2.19
L ₄	Rp. 17.271.100	2.32
BNJ (5%)	TN	TN
M ₁	Rp. 15.482.940	2.10
M ₂	Rp. 15.053.885	2.04
BNJ (5%)	TN	TN

Keterangan: - Angka-angka yang diikuti huruf yang sama menunjukkan tidak berbeda nyata pada uji BNJ 5%. -TN: Tidak Nyata. (hsi) : Hari Setelah

Penerimaan usaha tani perlakuan L₄ (40% substrat afkir) memiliki pendapatan tertinggi yakni Rp. 17.271.100 dalam 11 periode tanam atau dalam waktu 1 tahun., demikian juga nilai R/C rasio tertinggi terletak pada perlakuan L₄ yaitu 2,32 menunjukkan keberhasilan dan kelayakan secara ekonomi usaha budidaya jamur merang layak untuk diterapkan. Sundari (2011) mengungkapkan ukuran ekonomi pada umumnya untuk menggambarkan kinerja sektor dan komoditas agribisnis adalah R/C rasio (*revenue and cost ratio*) yang menunjukkan perbandingan antara pendapatan dan modal usaha biaya tani.

Kesimpulan Dan Saran

Metode pembuatan bibit yang berbeda berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur Merang (*Volvariella volvaceae*) Metode M₁ (TEL) lebih

cepat dalam variabel Kecepatan Miselium memenuhi media, awal muncul badan buah (*pindhead*) panen pertama dan lama total periode tanam. Sedangkan perlakuan penambahan substrat afkir L₄ menunjukkan pendapatan Rp. 17.271.100 dalam 11 periode tanam. Disarankan petani menggunakan metode M₁ (TEL) dalam melakukan usaha budidaya dan penambahan substrat akhir 40%.

Daftar Pustaka

- Hafifi, S. 2013. Uji Efektifitas dan Efisiensi Metode Tanam Eksplan Langsung (TEL) Sebagai Inovasi Pembibitan Jamur Tiram Putih Dibandingkan Dengan Biakan Murni Miselium (BMM).Universitas islam Malang. Malang.
- Kimenju, J.W, G.O.M. Odero, E.W. Mutitu, P.M. Wachira, R.D. Narla and W.M. Muiru. 2009. Suitability of locally available substrates for oyster mushroom (*Pleurotus oestreatus*) cultivation in Kenya. Asian journal of plant science ISSN 1682-3974 Volume 8(7) :210-214.
- Kumar U., S. Bikash, A. Dey, S. Kamal and B.P Bhatt. 2016. Energy use efficiency of oyster mushroom production in a selected tribal village. International Journal of Agriculture Sciences. 8 (7) :1069-1071.
- Satpal, S., S. Gopal, R.N.Siddarth, P. Bhanu, T. Sonika, K. Ankit, B. Priyanka and P.R. Kumar. 2017b. Effect of different substrates on the growth and yield of oyster mushrooms (*Pleurotus djamor*). Journal of

- Agriculture Sciences*. 9 (4): 3721-3723.
- Shah ,Z.A, M. Ashraf and M. Istiaq Ch. 2004. Comparative study and cultivation and yield performance of oyster mushroom (*Pleoratus oestreatus*) On different substrates (Wheat straw, Leaves, Saw Dust). *Pakistan Journal of Nutrition* 3(3) :158-160.
- Sugianto, A. 2013. Inovasi Teknologi TEL Jamur Tiram Putih. ISBN-978-602-795-732-9. Aditya Media. Malang. 278 hal.
- Sugianto, A. 2015. *Pengembangan Teknoligi Jamur Kayu Sebagai Pangan Alternatif*. Aditya Media Malang.
- Sugianto, A. 2017. *Pengembangan Teknoligi Jamur Kayu Sebagai Pangan Alternatif*. Intimedia. Malang
- Sundari, M.T. 2011. *Analisis Biaya Dan Pendapatan Usaha Tani Wortel Di Kabupaten Karanganyar*. *SEPA : Vol. 7 No.2 Pebruari 2011* : 119 – 126